<table>
<tr><th colspan="2">種類</th><th>接種対象年齢</th><th colspan="2">接種回数
接種開始時年齢</th><th>接種方法
※(　)は標準的な接種時期</th></tr>
<tr><td rowspan="2">ロタウイルス感染症
※いずれかを選択して接種</td><td>ロタリックス（1価）</td><td>出生 6 週 0 日後～24 週 0 日後</td><td rowspan="2">初回接種は出生 6 週 0 日後～出生 14 週 6 日後まで</td><td>2 回</td><td>27 日以上の間隔をおいて 2 回接種</td></tr>
<tr><td>ロタテック（5 価）</td><td>出生 6 週 0 日後～32 週 0 日後</td><td>3 回</td><td>27 日以上の間隔をおいて 3 回接種</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">ヒブ感染症</td><td rowspan="5">生後 2 か月～5 歳未満</td><td rowspan="2">生後 2 か月～生後 7 か月未満
※この時期の接種開始が標準接種期間</td><td>初回 3 回</td><td>1 歳未満までに、27 日以上（27～56 日）の間隔をおいて 3 回接種</td></tr>
<tr><td>追加 1 回</td><td>初回接種後、7 か月以上（7～13 か月）の間隔をおいて接種(注 1)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生後 7 か月～1 歳未満</td><td>初回 2 回</td><td>1 歳未満までに 27 日以上（27 日～56 日）の間隔をおいて 2 回接種</td></tr>
<tr><td>追加 1 回</td><td>初回接種後、7 か月以上（7～13 か月）の間隔をおいて接種(注 1)</td></tr>
<tr><td>1 歳～5 歳未満</td><td>1 回</td><td>―</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">小児肺炎球菌</td><td rowspan="5">生後 2 か月～5 歳未満</td><td rowspan="2">生後 2 か月～生後 7 か月未満
※この時期の接種開始が標準接種期間</td><td>初回 3 回</td><td>2 歳未満までに、27 日以上の間隔をおいて 3 回接種(注 2)</td></tr>
<tr><td>追加 1 回</td><td>初回接種後、60 日以上の間隔をおいて、1 歳以降（生後 12～15 か月）に接種</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生後 7 か月～1 歳未満</td><td>初回 2 回</td><td>2 歳未満までに、27 日以上の間隔をおいて 2 回接種</td></tr>
<tr><td>追加 1 回</td><td>初回接種後、60 日以上の間隔をおいて、1 歳以降（生後 12 か月～15 か月）に接種</td></tr>
<tr><td>1 歳～2 歳未満</td><td>2 回</td><td>60 日以上の間隔をおいて接種</td></tr>
<tr><td colspan="2">B型肝炎（注 3）</td><td>1 歳未満</td><td>―</td><td>3 回</td><td>27 日以上の間隔をおいて 2 回接種
1 回目から 139 日以上の間隔をおいて 1 回接種</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎(ポリオ)〈第1期〉</td><td rowspan="2">生後 2 か月～7 歳 6 か月未満</td><td rowspan="2">―</td><td>初回 3 回</td><td>20 日以上（20～56 日）の間隔をおいて 3 回接種</td></tr>
<tr><td>追加 1 回</td><td>初回接種後、6 か月以上（12～18 か月）の間隔をおいて 1 回接種</td></tr>
<tr><td colspan="2">ジフテリア・破傷風 〈第2期〉</td><td>11 歳～13 歳未満</td><td>―</td><td>1 回</td><td>標準的な接種時期は 11 歳～12 歳</td></tr>
<tr><td colspan="2">結核(BCG)</td><td>1 歳未満</td><td>―</td><td>1 回</td><td>標準的な接種時期は生後 5～8 か月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">麻しん・風しん（MR）</td><td>第 1 期</td><td>1 歳～2 歳未満</td><td>―</td><td>1 回</td><td>―</td></tr>
<tr><td>第 2 期</td><td>幼稚園・保育園の年長児相当</td><td>―</td><td>1 回</td><td>【平成 29 年 4 月 2 日～平成 30 年 4 月 1 日生まれ】
※令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日の間に接種</td></tr>
<tr><td colspan="2">水痘(水ぼうそう)</td><td>1 歳～3 歳未満</td><td>―</td><td>2 回</td><td>3 か月以上（6 か月～12 か月）の間隔をおいて接種</td></tr>
<tr><td rowspan="3">日本脳炎</td><td rowspan="2">第1期</td><td rowspan="2">生後 6 か月～7 歳 6 か月未満</td><td rowspan="2">―</td><td>初回 2 回</td><td>6 日以上（6～28 日）の間隔をおいて 2 回接種</td></tr>
<tr><td>追加 1 回</td><td>初回接種後、6 か月以上（概ね 1 年）の間隔をおいて接種</td></tr>
<tr><td>第 2 期</td><td>9 歳～13 歳未満</td><td>―</td><td>1 回</td><td>標準的な接種時期は 9～10 歳</td></tr>
<tr><td colspan="2">日本脳炎特例措置</td><td>平成 15 年 4 月 2 日～平成 19 年 4 月 1 日生</td><td>―</td><td>4 回接種のうち不足分</td><td>接種間隔は市 HP「日本脳炎の予防接種について」でご確認ください。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)</td><td rowspan="5">小学校 6 年生～高校 1 年生相当の女子

〈キャッチアップ接種〉
平成 9 年 4 月 2 日～平成 19 年 4 月 1 日生の方で積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した女性</td><td rowspan="2">―</td><td rowspan="2">3 回</td><td>■2 価ワクチン【サーバリックス】
2 回目：1 回目接種から 1 か月以上の間隔をおいて接種
3 回目：1 回目から 5 か月以上かつ、2 回目から 2 か月以上の間隔をおいて接種
〈一般的な接種スケジュール〉
2 回目：1 回目接種から 1 か月後
3 回目：1 回目接種から 6 か月後</td></tr>
<tr><td>■4 価ワクチン【ガーダシル】
2 回目：1 回目から 1 か月以上の間隔をおいて接種
3 回目：2 回目から 3 か月以上の間隔をおいて接種
〈一般的な接種スケジュール〉
2 回目：1 回目から 2 か月後
3 回目：1 回目から 6 か月後</td></tr>
<tr><td>12 歳～15 歳未満</td><td>2 回</td><td>■9 価ワクチン【シルガード】
2 回目：1 回目か 5 か月(6 か月)以上の間隔をおいて接種(注 3)
〈一般的な接種スケジュール〉
2 回目：1 回目から6か月後</td></tr>
<tr><td>15 歳～</td><td>3 回</td><td>2 回目：1 回目から 1 か月以上の間隔をおいて接種
3 回目：2 回目から 3 か月以上の間隔をおいて接種
〈一般的な接種スケジュール〉
2 回目：1 回目から 2 か月後
3 回目：1 回目から 6 か月後</td></tr>
</table>

（注1）　生後 2 か月～生後 12 か月に接種を開始した者が、初回接種を終了せずに生後 12 か月を超えた場合は、初回接種に係る最後の接種終了後 27 日（医師が必要と認めるときは 20 日）以上の間隔をおいて 1 回接種して終了となります。

（注2）　生後 12 か月を超えて 2 回目の接種を行った場合は、3 回目の接種は行わないものとします。

（注3）　接種間隔は 5 か月未満である場合、3 回目の接種が必要になります。