

種類		接種対象年齢	接種回数		接種方法 ※()は標準的な接種時期	
			接種開始時年齢			
ロタウイルス ※いずれかを 選択して接種	ロタリックス (1価)	出生6週0日後～ 24週0日後	初回接種は 出生6週0日後～ 出生14週6日後 まで	2回	27日以上の間隔をおいて2回接種	
	ロタテック (5価)	出生6週0日後～ 32週0日後		3回	27日以上の間隔をおいて3回接種	
小児肺炎球菌		生後2か月～ 5歳未満	生後2か月～ 生後7か月未満 ※この時期の接種開 始が標準接種期間	初回3回	2歳未満までに、27日以上の間隔をおいて3回接種(注2)	
				追加1回	初回接種後、60日以上の間隔をおいて、1歳以降(生後12～15か月)に接種	
				生後7か月～ 1歳未満	初回2回	2歳未満までに、27日以上の間隔をおいて2回接種
					追加1回	初回接種後、60日以上の間隔をおいて、1歳以降(生後12か月～15か月)に接種
B型肝炎(注3)		1歳未満	—	3回	27日以上の間隔をおいて2回接種 1回目から139日以上の間隔をおいて1回接種	
ジフテリア・百日せき ・破傷風・ポリオ・インフルエ ンザ菌b型(ヒブ) (5種混合)		生後2か月～ 7歳6か月未満	—	初回3回	20日以上(20～56日)の間隔をおいて3回接種	
				追加1回	初回接種後、6か月以上(12～18か月)の間隔をおいて1回接種	
インフルエンザ菌b型 (ヒブ)		生後2か月～ 5歳未満	生後2か月～ 生後7か月未満 ※この時期の接種開 始が標準接種期間	初回3回	1歳未満までに、27日以上(27～56日)の間隔をおいて3回接種	
				追加1回	初回接種後、7か月以上(7～13か月)の間隔をおいて接種(注1)	
				生後7か月～ 1歳未満	初回2回	1歳未満までに27日以上(27日～56日)の間隔をおいて2回接種
					追加1回	初回接種後、7か月以上(7～13か月)の間隔をおいて接種(注1)
ジフテリア・百日せき ・破傷風・ポリオ (4種混合)		生後2か月～ 7歳6か月未満	—	初回3回	20日以上(20～56日)の間隔をおいて3回接種	
				追加1回	初回接種後、6か月以上(12～18か月)の間隔をおいて1回接種	
ジフテリア・破傷風 第2期		11歳～13歳未満	—	1回	標準的な接種時期は11歳～12歳	
BCG		1歳未満	—	1回	標準的な接種時期は生後5～8か月	
麻しん・風しん (MR)	第1期	1歳～2歳未満	—	1回	—	
	第2期	幼稚園・保育園の 年長児相当	—	1回	【平成30年4月2日～平成31年4月1日生まれ】 ※令和6年4月1日～令和7年3月31日の間に接種	
水痘(水ぼうそう)		1歳～3歳未満	—	2回	3か月以上(6か月～12か月)の間隔をおいて接種	
日本脳炎	第1期	生後6か月～ 7歳6か月未満	—	初回2回	6日以上(6～28日)の間隔をおいて2回接種	
	追加1回			追加1回	初回接種後、6か月以上(概ね1年)の間隔をおいて接種	
第2期		9歳～13歳未満	—	1回	標準的な接種時期は9～10歳	
日本脳炎特例措置		平成16年4月2日～ 平成19年4月1日生 の方で20歳に達する までの間	—	4回接種の うち不足分	接種間隔は市HP「日本脳炎の予防接種について」でご確認ください。	
ヒトパピローマウイルス (HPV)		小学校6年生～ 高校1年生相当の女 子 〈キャッチアップ接種〉 平成9年4月2日～ 平成20年4月1日生 の方で積極的な勧奨 の差し控えにより接 種機会を逃した女性	—	3回	■2価ワクチン【サーバリックス】 2回目:1回目接種から1か月以上の間隔をおいて接種 3回目:1回目から5か月以上かつ、2回目から2か月以上の間隔をおいて接種 〈一般的な接種スケジュール〉 2回目:1回目接種から1か月後 3回目:1回目接種から6か月後	
					■4価ワクチン【ガーダシル】 2回目:1回目から1か月以上の間隔をおいて接種 3回目:2回目から3か月以上の間隔をおいて接種 〈一般的な接種スケジュール〉 2回目:1回目から2か月後 3回目:1回目から6か月後	
		12歳～15歳未満	—	2回	■9価ワクチン【シルガード】 2回目:1回目か5か月(6か月)以上の間隔をおいて接種(注3) 〈一般的な接種スケジュール〉 2回目:1回目から6か月後	

		15歳～	3回	2回目:1回目から1か月以上の間隔をおいて接種 3回目:2回目から3か月以上の間隔をおいて接種 〈一般的な接種スケジュール〉 2回目:1回目から2か月後 3回目:1回目から6か月後
--	--	------	----	--

(注1) 生後2か月～生後12か月に接種を開始した者が、初回接種を終了せずに生後12か月を超えた場合は、初回接種に係る最後の接種終了後27日(医師が必要と認めるときは20日)以上の間隔をおいて1回接種して終了となります。

(注2) 生後12か月を超えて2回目の接種を行った場合は、3回目の接種は行わないものとします。

(注3) 接種間隔は5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。